

**Follow-up Untersuchungen für Hepatoblastom and Hepatozelluläres Karzinom
(Empfehlungen der HB/HCC GPOH study group, 08/2017)**

| Zeitpunkt ab Diagnose | 1. bis 3. Jahr | 4. bis 5. Jahr | > 5. Jahr |
|--|---|---|--|
| Körperliche Untersuchung | 3 mo | 6 mo | jährlich |
| AFP im Serum | 3 mo | 6 mo | |
| Tumor assessment: Abdomen-Ultraschall | 3 mo | 6 mo | |
| Erfassung von Lungenmetastasen: Röntgen-Thorax | 3 mo | 6 mo | |
| Serum Magnesium, falls Cisplatin oder Carboplatin gegeben wurden | jährlich | jährlich | jährlich |
| Kreatinin clearance, falls <80ml/min/1.73m ² | jährlich | jährlich | jährlich |
| Audiometrie, Cisplatin oder Carboplatin gegeben wurden | jährlich | jährlich | jährlich |
| EchoKardiogramm (falls Anthrazyline gegeben wurden) | jährlich, falls Kumulative Dosis ≥250 mg/m ² , sonst alle 2 Jahre | jährlich, falls Kumulative Dosis ≥250 mg/m ² , sonst alle 2 Jahre | jährlich, falls Kumulative Dosis ≥250 mg/m ² , sonst alle 2 Jahre |